



PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE A ESCALA CAM-ICU NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL PRIVADO



Vitória Meireles Felipe de Souza^I; Marcos Aurélio Pinto da Silva^I; Ellen Fernandes Menez^{II}; Nelcilene Ferreira de Jesus^{II}; Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho^I

^IUniversidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, BRASIL

^{II}Hospital Adventista Silvestre, Cosme Velho, RJ, BRASIL

INTRODUÇÃO

- O delirium caracteriza-se como uma síndrome neuropsiquiátrica decorrente de alterações na função do sistema nervoso e deterioração cognitiva, capaz de ocasionar mortalidade, que se desenvolve ao longo de um curto período de tempo (horas ou dias) e flutua ao longo do dia.
- Entre os principais fatores desencadeadores desse distúrbio está à ventilação mecânica, o mecanismo principiante está ligado a extubação não intencional, reintubação, tempo de internação.
- Um dos métodos recomendados para o diagnóstico e a avaliação desse evento é a escala Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU).

OBJETIVO

- Avaliar a percepção dos enfermeiros sobre a Escala de CAM-ICU nas Unidades Fechadas, de um Hospital Privado.

MÉTODO

- Trata-se de um estudo descritivo, de caráter transversal, com abordagem quantitativa.
- A pesquisa foi realizada com 16 enfermeiros que trabalhavam nos períodos diurno e noturno das Unidades Fechadas (CTI Clínico, CTI cirúrgico e Unidade Coronariana).
- A coleta de dados ocorreu de Setembro a Novembro de 2019.
- Aplicação de um questionário semiestruturado composto por 6 questões de caráter objetivo com duas variáveis dicotômicas (1 -SIM; 2-NÃO) nas duas primeiras, e três variáveis categóricas nas demais.
- A pesquisa atende a Res.466/12, n.2.831.142.Resultados:

RESULTADOS

- Foi observado que 43,45% dos enfermeiros não demonstram o conhecimento sobre a Escala de CAM-ICU bem como nunca realizaram a sua aplicação.
- Em relação ao quantitativo de enfermeiro por setor, 25% UTI Clínica; 25% UTI Cirúrgica e 60,50% da Unidade Coronariana.
- Destaca-se que 87,50% informaram que atualmente não é realizada a aplicação do instrumento.
- Além disso, 75% afirmaram que o enfermeiro que deve desenvolver a aplicação da escala.
- 62,50% dos enfermeiros demonstraram através do questionário que o perfil dos pacientes que deve ser aplicada a Escala de CAM-ICU são os pacientes lúcidos.

CONCLUSÃO

- Portanto, é perceptível as principais necessidades e limitações para o desenvolvimento da assistência de enfermagem a partir do uso do instrumento de rastreamento CAM -ICU.
- É certo que, além dos impactos negativos do delirium nos pacientes, não detectar e tratá-lo acarretará prejuízos assistências, orçamentais, maior tempo de internação do paciente, entre outras consequências.
- Isso pode ser minimizado através do desenvolvimento de diretrizes clínicas pré-formuladas, bem como fornecer informações regulares educação e treinamento em serviços.

Contato: vifelipe@id.uff.br